

Matematika I

Ing. Radek Fučík, Ph.D.
WikiSkriptum

verze: 25. září 2023

Obsah

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Úvod | 4 |
| 1.1 | Množiny | 4 |
| 1.2 | Výroky | 4 |
| 1.3 | Číselné množiny | 5 |
| 1.4 | Důkaz matematickou indukcí | 6 |
| 1.5 | Intervaly | 6 |
| 1.6 | Omezenost množin | 7 |
| 1.7 | Absolutní hodnota | 7 |
| 2 | Funkce | 7 |
| 2.1 | Definice | 7 |
| 2.2 | Základní funkce | 8 |
| 2.3 | Algebraické kombinace funkcí | 9 |
| 2.4 | Prostá a inverzní funkce | 9 |
| 2.5 | Parita | 9 |
| 2.6 | Obraz, vzor | 10 |
| 3 | Limita funkce | 10 |
| 3.1 | Definice | 10 |
| 3.2 | Vlastnosti limity | 10 |
| 3.3 | Jednoznačnost limity | 11 |
| 3.4 | Nekonečné limity | 11 |
| 3.5 | Věta o limitě sevřené funkce | 12 |
| 3.6 | Goniometrické limity | 13 |
| 3.7 | Asymptota funkce | 13 |
| 4 | Spojitost funkce | 14 |
| 4.1 | Definice | 14 |
| 4.2 | Vlastnosti spojitých funkcí | 15 |
| 5 | Derivace funkce | 15 |
| 5.1 | Definice | 15 |
| 5.2 | Pravidla pro derivování | 16 |
| 5.3 | Derivace složené funkce | 18 |
| 5.4 | Derivace inverzní funkce | 18 |
| 5.5 | Tečna a normála | 18 |
| 5.6 | Derivace cyklometrických funkcí | 19 |
| 5.6.1 | Funkce arcsin | 19 |
| 5.6.2 | Funkce arccos | 19 |
| 5.6.3 | Funkce arctg | 20 |
| 5.6.4 | Funkce arccotg | 21 |
| 6 | Užití derivace k vyšetřování funkce | 21 |
| 6.1 | Věty o přírůstku funkce | 21 |
| 6.2 | Monotonie | 23 |
| 6.3 | Lokální a globální extrémy | 23 |
| 6.4 | Test extrému dle 1. derivace | 24 |
| 6.5 | Test extrému dle 2. derivace | 24 |
| 6.6 | Konvexní a konkávní funkce | 24 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 6.7 | l'Hôpitalovo pravidlo | 25 |
| 6.8 | Vyšetřování průběhu funkce | 25 |
| 7 | Integrální počet | 26 |
| 7.1 | Primitivní funkce a neurčitý integrál | 26 |
| 7.2 | Určitý integrál | 27 |
| 7.3 | Vlastnosti určitého integrálu | 30 |
| 8 | Transcendentní funkce | 31 |
| 8.1 | Algebraické a transcendentní funkce | 31 |
| 8.2 | Logaritmická funkce | 31 |
| 8.3 | Přirozený logaritmus | 32 |
| 8.4 | Exponenciální funkce | 32 |
| 8.5 | Obecná mocnina | 33 |
| 8.6 | Obecná báze logaritmu | 33 |
| 8.7 | Hyperbolické funkce | 34 |
| 8.8 | Inverzní hyperbolické funkce | 35 |
| 8.9 | Pokročilé techniky integrace goniometrických funkcí | 36 |
| 8.10 | Shrnutí integračních vzorců | 37 |
| 9 | Aplikace integrálu | 37 |
| 9.1 | Výpočet plochy | 37 |
| 9.2 | Výpočet polohy těžiště | 38 |
| 9.3 | Délka grafu funkce | 39 |
| 9.4 | Objem a povrch rotačního tělesa | 39 |
| Reference | | 39 |

1 Úvod

V této úvodní kapitole se seznámíme se základními matematickými pojmy, značením, operacemi s množinami a základy matematické logiky. Dále jsou zde stručně probrány číselné množiny, intervaly, pojem omezenosti množiny, horní hranice (závora) množiny a konečně význam absolutní hodnoty čísla.

1.1 Množiny

Definice 1.1 (Naivní definice množiny — Cantor 1873)

Soubor dobře definovaných a dobře rozlišitelných objektů se nazývá **množina**. Množiny zapisujeme ve tvaru

$$M = \{\text{prvek } x : \text{vlastnosti prvku } x\}.$$

Definice 1.2 (Operace s množinami)

Nechť A a B jsou nějaké množiny a x je prvek. Potom definujeme následující symboly:

| | |
|-----------------|---|
| $x \in A$ | prvek x náleží množině A . |
| $x \notin A$ | prvek x nenáleží množině A . |
| $A \subset B$ | množina A je částí množiny B . |
| $A \cup B$ | sjednocení množin A a B . |
| $A \cap B$ | průnik množin A a B . |
| \emptyset | prázdná množina. |
| $A = \{x : V\}$ | zápis množiny, která má prvky x , o kterých platí vlastnost V , např. $V : x > 0$. |

Poznámka. Vlastnosti prázdné množiny \emptyset :

- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$

Příklad. Nechť $A = \{\varnothing\}$, $B = \{\sigma, \varnothing\}$, pak platí:

- $A \subset B$
- $A \cap B = \{\varnothing\} = A$
- $A \cup B = \{\sigma, \varnothing\} = B$

Definice 1.3 (Kartézscký součin množin A a B)

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ a } y \in B\}$$

1.2 Výroky

Definice 1.4 (Výrok)

Výrok je tvrzení, o kterém můžeme rozhodnout zda platí nebo neplatí.

Definice 1.5 (Přehled operací s výroky)

Nechť V_1 a V_2 jsou výroky. Potom definujeme následující značení:

| | |
|-----------------------------|---|
| V_1 | výrok V_1 (platí). |
| $\neg V_1$ | negace výroku V_1 (výrok V_1 neplatí). |
| $V_1 \wedge V_2$ | konjunkce - platí V_1 a zároveň V_2 . |
| $V_1 \vee V_2$ | disjunkce - platí V_1 nebo V_2 . |
| $V_1 \Rightarrow V_2$ | implikace - když platí V_1 , pak platí V_2 . |
| $V_1 \Leftrightarrow V_2$ | ekvivalence - V_1 platí právě tehdy, když platí V_2 . |
| \exists | existenční kvantifikátor - existuje aspoň jeden prvek ... |
| \exists_1 nebo $\exists!$ | existenční kvantifikátorl - existuje právě jeden prvek ... |
| \exists_∞ | existenční kvantifikátor - existuje nekonečně prvků ... |
| \forall | kvantifikátor: pro všechny prvky ... |

Poznámka. Výlučná disjunkce (exkluzivní disjunkce, non-ekvivalence): $(V_1 \vee V_2) \wedge \neg(V_1 \wedge V_2)$.

Definice 1.6 (Tabulka pravdivostních hodnot pro operace s výroky)

V následující tabulce **P** znamená platí a **N** neplatí:

| V_1 | V_2 | $V_1 \wedge V_2$ | $V_1 \vee V_2$ | $V_1 \Rightarrow V_2$ | $V_1 \Leftrightarrow V_2$ |
|-------|-------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| P | P | P | P | P | P |
| P | N | N | P | N | N |
| N | P | N | P | P | N |
| N | N | N | N | P | P |

Lemma 1.7

Pravidla při negování výroků (z definice 1.6):

1. $\neg(V_1 \vee V_2) = \neg V_1 \wedge \neg V_2$
2. $\neg(V_1 \wedge V_2) = \neg V_1 \vee \neg V_2$
3. $\neg(V_1 \Rightarrow V_2) = V_1 \wedge \neg V_2$
4. $\neg(\exists x \in M) = \forall x \in M$
5. $\neg(\forall x \in M) = \exists x \in M$

1.3 Číselné množiny

Definice 1.8 (Značení číselných množin)

Přirozená čísla \mathbb{N} , $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$.

Celá čísla \mathbb{Z} , $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Racionální čísla \mathbb{Q} , $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$.

Reálná čísla \mathbb{R} .

Iracionální čísla $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Komplexní čísla \mathbb{C} , $\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$.

Lemma 1.9 (Vlastnosti reálných čísel)

Nechť a, b, c jsou reálná čísla. Potom platí:

1. $(a < b) \vee (a > b) \vee (a = b)$
2. $(a < b) \wedge (b < c) \Rightarrow (a < c)$ transitivita
3. $(a + b < a + c) \Rightarrow (b < c)$

4. $(a < b) \wedge (c > 0) \Rightarrow ac < cb$
- $(a < b) \wedge (c < 0) \Rightarrow ac > cb$

Věta 1.10 (O hustotě \mathbb{R})

Mezi libovolnými různými reálnými čísly je nekonečně mnoho racionálních a nekonečně mnoho iracionálních čísel.

Důsledek 1.11

Neexistuje nejmenší kladné reálné číslo.

Důkaz. **Sporem.** Principem důkazu sporem je ukázat, že negace tvrzení vede ke sporu. Matematická věta je obvykle zapsána pomocí implikace výroků

$$\text{Předpoklad} \Rightarrow \text{Tvrzení}, \quad (1)$$

přičemž podle pravidel negování výroku (Lemma 1.7) je její negace

$$\neg(\text{Předpoklad} \Rightarrow \text{Tvrzení}) = \text{Předpoklad} \wedge \neg\text{Tvrzení}, \quad (2)$$

Uvažujme následující slovní vyjádření výroku (ozn. V): *Není pravda, že by existovalo kladné reálné číslo, které by bylo menší než všechna ostatní reálná čísla (různá od tohoto čísla).* Kvantifikovaně lze výrok V vyjádřit takto:

$$V = \neg(\exists c \in \mathbb{R}, c > 0)(\forall r \in \mathbb{R}, r > 0, r \neq c)(c < r)$$

Tento výrok lze převést pomocí pravidel pro negování výrazů s \exists a \forall na výrok

$$V = (\forall c \in \mathbb{R}, c > 0)(\exists r \in \mathbb{R}, r > 0, r \neq c)(c \geq r),$$

které vyjadřuje ekvivalentní tvrzení *Pro všechna kladná reálná čísla c existuje aspoň jedno reálné číslo r takové, že je ostře menší než c .*

Pro důkaz sporem tedy předpokládejme, že platí negace výroku V , to jest

$$\neg V = (\exists c \in \mathbb{R}, c > 0)(\forall r \in \mathbb{R}, r > 0, r \neq c)(c < r)$$

Označme si toto nejmenší číslo, které nyní předpokládáme, že existuje, symbolem c_{min} . Potom ale podle věty 1.10 mezi čísla 0 a c_{min} existuje alespoň jedno číslo x tak, že $0 < x < c_{min}$. Tedy díky větě 1.10 snadno nalezneme kladné reálné číslo, které je menší než údajně nejmenší číslo c_{min} , což je spor. \square

1.4 Důkaz matematickou indukcí

Poznámka. Princip důkazu tvrzení $V[n]$ matematickou indukcí. Tvrzení $V[n]$ nazýváme **indukční předpoklad**.

1. **První krok.** Ověříme, že tvrzení platí pro nejnižší index, např. že $V[1]$ platí.
2. **Indukční krok** $n \rightarrow n + 1$. Za předpokladu, že platí $V[n]$, dokážeme platnost $V[n + 1]$.

1.5 Intervaly

Definice 1.12 (Interval)

Otevřený interval $(a, b) = \{ x \in \mathbb{R} : a < x < b \}$

Uzavřený interval $[a, b] = \{ x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b \}$

Polootevřený (polouzavřený) interval $[a, b) = \{ x \in \mathbb{R} : a \leq x < b \}$

Definice 1.13 (Nekonečno)

Pro symbol $+\infty$ platí, že $(\forall x \in \mathbb{R})(x < +\infty)$.

Pro symbol $-\infty$ platí, že $(\forall x \in \mathbb{R})(x > -\infty)$.

1.6 Omezenost množin

Definice 1.14 (Omezenost množiny)

Říkáme, že množina M je omezená shora $\Leftrightarrow (\exists h \in \mathbb{R})(\forall x \in M)(x \leq h).$

Říkáme, že množina M je omezená zdola $\Leftrightarrow (\exists d \in \mathbb{R})(\forall x \in M)(x \geq d).$

Říkáme, že množina M je omezená \Leftrightarrow je omezená shora i zdola.

Říkáme, že množina M je neomezená \Leftrightarrow není omezená shora ani zdola.

Definice 1.15 (Závora množiny)

Číslo h , resp. d z definice 1.14 nazýváme horní, resp. dolní závora (hranice) množiny M .

1.7 Absolutní hodnota

Definice 1.16 (Absolutní hodnota)

Absolutní hodnota čísla $x \in \mathbb{R}$ je

$$|x| = \begin{cases} x & \text{pro } x \geq 0 \\ -x & \text{pro } x < 0 \end{cases}.$$

Poznámka. Platí $|x| = \max\{x, -x\}$ a hlavně $\sqrt{x^2} = |x|$.

Věta 1.17 (Trovjúhelníková nerovnost $\triangle \neq$)

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Důkaz. Platí:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2,$$

kde po odmocnění levé a pravé strany nerovnosti dostáváme

$$|a + b| \leq |a| + |b| = |a| + |b|.$$

□

Důsledek 1.18

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

Důkaz.

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \geq |a|^2 - 2|a||b| + |b|^2 = (|a| - |b|)^2,$$

kde po odmocnění levé a pravé strany nerovnosti dostaneme tvrzení věty. □

2 Funkce

2.1 Definice

Definice 2.1 (Funkce, definiční obor, obor hodnot)

Funkce f s **definičním oborem** D_f je předpis, který každému číslu $x \in D_f$ přiřadí právě jedno reálné číslo, které značíme $f(x)$. Množinu všech takto přiřazených čísel nazýváme **obor hodnot** a značíme H_f .

Definice 2.2 (Graf funkce)

Grafem funkce f je množina bodů v rovině (x,y) takových, že $x \in D_f$ a $y = f(x)$.

Věta 2.3

Množina \mathcal{F} je funkcí ve smyslu definice 2.1, právě tehdy, když pro všechny uspořádané dvojice čísel (x, y) platí:

$$((x, y) \in \mathcal{F} \wedge (x, z) \in \mathcal{F}) \Rightarrow y = z.$$

2.2 Základní funkce

Definice 2.4 (Polynom)

Polynom p je funkce definovaná jako

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 x^0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k,$$

kde a_k jsou komplexní čísla pro všechny indexy $k = 0, 1, \dots, n$. Pokud a_n je nejvyšší nenulový koeficient polynomu (tj. $a_k = 0$ pro všechna $k > n$), říkáme, že takový polynom má stupeň n . Definiční obor každého polynomu je $D_p = \mathbb{C}$, obor hodnot závisí na každé konkrétní volbě koeficientů a_k .

Poznámka. My budeme uvažovat výhradně polynomy reálné, tj. $a_k \in \mathbb{R}$ pro $\forall k = 0, 1, \dots, n$, a s $D_p = \mathbb{R}$.

Poznámka.

- Nulový polynom: $p(x) = 0$.
- Polynom 0. stupně: $p(x) = K$, kde $K \neq 0$.
- Polynom 1. stupně se nazývá *lineární* polynom.
- Polynom 2. stupně se nazývá *kvadratický* polynom.
- Polynom 3. stupně se nazývá *kubický* polynom.
- Polynom 4. stupně se nazývá *bikvadratický* polynom.

Definice 2.5 (Kořen polynomu)

Bod $x_0 \in \mathbb{R}$ takový, že $p(x_0) = 0$, nazýváme kořenem (též nulovým bodem) polynomu p .

Věta 2.6 (Základní věta algebry)

Každý polynom stupně alespoň prvního má v \mathbb{C} alespoň jeden kořen.

Věta 2.7

Každý polynom stupně n má nejvýše n kořenů.

Poznámka. Dalšími základními funkcemi jsou:

- Odmocnina \sqrt{x} , $D_{\sqrt{\cdot}} = \mathbb{R}_0^+$, $H_{\sqrt{\cdot}} = \mathbb{R}_0^+$
- Racionální funkce $\frac{1}{x}$, $D_{\frac{1}{x}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H_{\frac{1}{x}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- Absolutní hodnota $|x|$, $D_{|x|} = \mathbb{R}$, $H_{|x|} = \mathbb{R}_0^+$
- Funkce signum $\text{sign } x = \begin{cases} 1 & \text{pro } x > 0 \\ 0 & \text{pro } x = 0 \\ -1 & \text{pro } x < 0 \end{cases}$

2.3 Algebraické kombinace funkcí

Definice 2.8 (Algebraické kombinace funkcí)

Nechť f je funkce s definičním oborem D_f a g je funkce s definičním oborem D_g , nechť $D_f = D_g$. Pak lze definovat následující nové funkce:

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in D_g : (\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

Definice 2.9 (Skládání funkcí)

Nechť $(\forall x \in D_g)(g(x) \in D_f)$, pak $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Poznámka. Skládání funkcí není komutativní, tj. obecně $f \circ g \neq g \circ f$.

2.4 Prostá a inverzní funkce

Definice 2.10 (Prostá funkce)

Funkce f je **prostá**, právě když neexistují dva různé body z D_f na kterých by f nabývala stejné hodnoty. Tj. $(\forall x_1, x_2 \in D_f)(f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$.

Věta 2.11 (O existenci a jednoznačnosti inverzní funkce)

Je-li funkce f prostá, pak **existuje právě jedna** funkce g s definičním oborem $D_g = H_f$ taková, že $f(g(x)) = x$ pro $\forall x \in D_g$.

Důkaz. Pro dané $y \in H_f$ existuje díky prostotě f právě jedno $x \in D_f$ tak, že $y = f(x)$. Toto x označíme $g(y) := x$ a dostaneme jednoznačný předpis $g : y \mapsto x$, který vyhovuje definici funkce. \square

Definice 2.12 (Inverzní funkce)

Funkci g z předchozí věty značíme $g = f^{-1}$ a nazýváme funkci **inverzní** k funkci f .

Věta 2.13

Funkce f^{-1} je inverzní k f právě tehdy, když $f^{-1} \circ f = \text{id}$ a $f \circ f^{-1} = \text{id}$.

Věta 2.14 (Inverze složené funkce)

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

Důkaz. $f(g(x)) = y$, odkud $g(x) = f^{-1}(y)$ odkud $x = g^{-1}(f^{-1}(y))$. \square

2.5 Parita

Definice 2.15 (Parita funkce)

Nechť funkce f má definiční obor symetrický dle 0. Pak říkáme, že funkce f je

- **sudá** $\Leftrightarrow (\forall x \in D_f)(f(-x) = f(x))$.
- **lichá** $\Leftrightarrow (\forall x \in D_f)(f(-x) = -f(x))$.

2.6 Obraz, vzor

Definice 2.16 (Obraz množiny)

Obraz množiny M při zobrazení f je množina

$$f(M) = \{y : (\exists x \in M)(f(x) = y)\}.$$

Definice 2.17 (Vzor množiny)

Vzor množiny M při zobrazení f je množina

$$f^{-1}(M) = \{x : (\exists y \in M)(f(x) = y)\}.$$

3 Limita funkce

3.1 Definice

Definice 3.1 (Limita funkce f v bodě a)

Nechť pro nějaké $a \in \mathbb{R}$ a $p > 0$ je sjednocení $(a - p, a) \cup (a, a + p)$ částí definičního oboru D_f .

Potom řekneme, že limita funkce f v bodě a je ℓ :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in (a - p, a) \cup (a, a + p)) (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon).$$

Definice 3.2 (Limita funkce f v bodě a zprava)

Nechť pro nějaké $a \in \mathbb{R}$ a $p > 0$ je sjednocení $(a, a + p)$ částí definičního oboru D_f . Potom řekneme, že limita funkce f v bodě a **zprava** je ℓ :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in (a, a + p)) (a < x < a + \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon).$$

Definice 3.3 (Limita funkce f v bodě a zleva)

Nechť pro nějaké $a \in \mathbb{R}$ a $p > 0$ je sjednocení $(a - p, a)$ částí definičního oboru D_f . Potom řekneme, že limita funkce f v bodě a **zleva** je ℓ :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in (a - p, a)) (a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon).$$

Věta 3.4 (Vztah existence limity a existence limit zleva a zprava)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \wedge \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$$

3.2 Vlastnosti limity

Lemma 3.5

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0.$$

Důkaz. Plyne z přímo z definice limity. □

Věta 3.6 (Ekvivalence zápisů limity)

Následující výroky jsou ekvivalentní:

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$,
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - \ell = 0$,

$$3. \lim_{x \rightarrow a} |f(x) - \ell| = 0,$$

$$4. \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \ell.$$

Věta 3.7 (Vlastnosti limity funkce)

Nechť $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ a $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$, kde $\ell, m \in \mathbb{R}$. Potom:

$$(i) \lim_{x \rightarrow a} (f+g)(x) = \ell + m,$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow a} (f-g)(x) = \ell - m,$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = \ell m,$$

$$(iv) \text{ pokud } m \neq 0, \text{ pak } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g}(x) = \frac{\ell}{m},$$

Důkaz. Plyne přímo z definice limity. \square

Důsledek 3.8

Nechť p je polynom. Potom $\forall a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a).$$

3.3 Jednoznačnost limity

Věta 3.9 (O jednoznačnosti limity funkce)

$$\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = m \right) \Rightarrow \ell = m.$$

Důkaz. Sporem.

Předpokládejme, že $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = m \wedge \ell \neq m$.

Zvolme $\varepsilon = \frac{1}{2}|\ell - m| > 0$ a z definic limit existují pro toto ε čísla $\delta_\ell > 0$ a $\delta_m > 0$ tak, že

$$\begin{aligned} 0 < |x - a| < \delta_\ell &\Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon \\ 0 < |x - a| < \delta_m &\Rightarrow |f(x) - m| < \varepsilon \end{aligned}$$

Definujme $\delta = \min\{\delta_\ell, \delta_m\}$, pak totiž pro $0 < |x - a| < \delta$ platí, že

$$\varepsilon = \frac{1}{2}|\ell - m| = \frac{1}{2}|f(x) - m - (f(x) - \ell)| \stackrel{\substack{\uparrow \\ \triangle \neq}}{\leq} \frac{1}{2}\underbrace{|f(x) - \ell|}_{< \varepsilon} + \frac{1}{2}\underbrace{|f(x) - m|}_{< \varepsilon} < \varepsilon.$$

Dohromady dostáváme nerovnici $\varepsilon < \varepsilon$, což je spor. \square

3.4 Nekonečné limity

Definice 3.10 (Nekonečná limita funkce f v bodě a)

Nechť pro nějaké $a \in \mathbb{R}$ a $p > 0$ je sjednocení $(a-p, a) \cup (a, a+p)$ částí definičního oboru D_f . Potom

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \Leftrightarrow (\forall \alpha > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in (a-p, a) \cup (a, a+p)) (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > \alpha),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow (\forall \alpha > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in (a-p, a) \cup (a, a+p)) (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < -\alpha).$$

Poznámka. Analogicky definice jednostranných limit

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty.$

Věta 3.11 (Vlastnosti nekonečných limit)

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \wedge \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell \neq -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \wedge \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell \neq +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \wedge \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = (\text{sign } \ell) \cdot \infty$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \wedge \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = (\text{sign } \ell) \cdot (-\infty)$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f}(x) \right) = 0$

Poznámka. Výrazy IND: „ $\infty - \infty$ “, „ $0 \cdot \infty$ “, „ $\frac{\infty}{\infty}$ “, „ $\frac{1}{0}$ “ a „ $\frac{0}{0}$ “ jsou neurčité, je potřeba provést algebraické manipulace před samotnou limitou.

Definice 3.12 (Limita funkce v nekonečnu)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x > \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon), \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x < -\delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon),\end{aligned}$$

Poznámka. Analogicky definice

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$

3.5 Věta o limitě sevřené funkce

Věta 3.13 (Sendvičová věta o limitě sevřené funkce)

Bud' $p > 0$ a nechť pro funkce d , f a h platí, že $(a - p, a) \cup (a, a + p) \subset D_f \cap D_d \cap D_h$ a pro všechna $x \in (a - p, a) \cup (a, a + p)$ je $d(x) \leq f(x) \leq h(x)$. Potom když $\lim_{x \rightarrow a} d(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$, pak existuje limita funkce f v bodě a a je rovna ℓ

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Důkaz. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ existuje z definic limit δ_d a δ_h tak, že pro všechna x taková, že

- $0 < |x - a| < \delta_d \Rightarrow \ell - \varepsilon < d(x) < \ell + \varepsilon$
- $0 < |x - a| < \delta_h \Rightarrow \ell - \varepsilon < h(x) < \ell + \varepsilon$

Zvolíme-li $\delta = \min\{\delta_d, \delta_h\}$, platí pro všechna x taková, že $0 < |x - a| < \delta$, nerovnosti

$$\ell - \varepsilon < d(x) < f(x) < h(x) < \ell + \varepsilon,$$

čímž je věta dokázána. □

Poznámka. Věta 3.13 platí i pro jednostranné limity a limity v nekonečnu.

3.6 Goniometrické limity

Poznámka. Základní vztahy mezi goniometrickými funkcemi:

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Lemma 3.14 (Snížení mocniny u goniometrických funkcí)


$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

Důkaz. Větu dokážeme pomocí součtových vzorců pro funkci $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$. \square

Věta 3.15

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$



Obrázek 1: Ilustrace k důkazu Věty 3.15.

Důkaz. Nechť $x > 0$ je úhel v radiánech. Z obrázku 1 je patrná následující nerovnost mezi plochami AEB , ACB a ACD :

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x,$$

odkud

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Z věty o limitě sevřené funkce snadno dostáváme tvrzení, které platí i o pro $x < 0$ neb funkce $\frac{\sin x}{x}$ je sudá. \square

3.7 Asymptota funkce

Definice 3.16 (Asymptota)

Přímku $y = kx + q$ nazveme asymptotou funkce f v $+\infty$, resp. $-\infty$, platí-li, že

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - kx - q = 0,$$

resp.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - kx - q = 0.$$

Definice 3.17 (Vertikální asymptota)

Přímku $x = a$ nazveme vertikální asymptotou funkce f , má-li funkce f v bodě a nekonečnou limitu zleva nebo zprava.

Věta 3.18 (Nalezení asymptoty)

$y = kx + q$ je asymptotou funkce f v $\pm\infty$ právě tehdy, když

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad (3a)$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx. \quad (3b)$$

Důkaz. Důkaz ekvivalence provedeme ve dvou krocích.

1. „ \Rightarrow “: Z definice asymptoty platí $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx - q = 0$, odkud přímo plyne (3b). Tvrzení (3a) dostaneme tak, že zkoumáme limitu

$$0 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x) - kx - q}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - k - \frac{q}{x} = \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \right) - k - 0.$$

2. „ \Leftarrow “: Z (3b) rovnou plyne definice asymptoty $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx - q = 0$. \square

4 Spojitost funkce

4.1 Definice

Definice 4.1 (Spojitost funkce v bodě a)

Nechť pro nějaké $p > 0$ je sjednocení $(a - p, a + p)$ částí D_f . Řekneme, že funkce f je spojitá v bodě a , právě když

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Definice 4.2 (Spojitost funkce v bodě a zleva a zprava)

Nechť pro nějaké $p > 0$ je sjednocení $(a - p, a]$, resp. $[a, a + p)$ částí D_f . Řekneme, že funkce f je **spojitá** v bodě a zleva, resp. zprava, právě když

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a), \quad \text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

Definice 4.3 (Spojitost na uzavřeném intervalu)

Řekneme, že funkce f je spojitá na intervalu $[a, b]$, právě když je spojitá v každém bodě $x \in (a, b)$, spojitá zprava v bodě a a zleva v bodě b .

Definice 4.4 (Odstranitelná nespojitost)

Funkce f má v bodě a **odstranitelnou nespojitost** $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existuje, ale $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$

Definice 4.5 (Skoková nespojitost)

Funkce f má v bodě a **skokovou nespojitost** \Leftrightarrow existují obě konečné jednostranné limity, ale nerovnají se.

Definice 4.6 (Podstatná nespojitost)

Funkce f má v bodě a **podstatnou nespojitost** \Leftrightarrow alespoň jedna jednostranná limita je nekonečná nebo neexistuje.

Věta 4.7

Funkce f je spojitá v bodě $a \Leftrightarrow$ Funkce f je spojitá v bodě a zleva i zprava.

Věta 4.8

Nechť jsou funkce f a g spojitá v bodě a a bud' $\alpha \in \mathbb{R}$. Potom funkce $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, $\alpha \cdot f$ i $\frac{f}{g}$ pro $g(a) \neq 0$ jsou spojité v a .

Věta 4.9

Nechť je funkce g spojitá v bodě a a funkce f spojitá v bodě $g(a)$. Potom funkce $f \circ g$ je spojité v a .

4.2 Vlastnosti spojitých funkcí

Věta 4.10 (Bolzano – o existenci nulového bodu spojité funkce)

Nechť funkce f je spojitá na intervalu $[a, b]$ a $f(a)f(b) < 0$. Potom existuje $c \in (a, b)$ tak, že $f(c) = 0$.

Důkaz. Obrázkový – graf spojité funkce nutně musí protnout osu x , pokud $f(a)$ a $f(b)$ mají opačná znamení. \square

Věta 4.11 (Darboux – o existenci řešení $f(c) = d$ pro spojitu funkci f)

Nechť funkce f je spojitá na intervalu $[a, b]$. Potom pro každé číslo d ležící mezi $f(a)$ a $f(b)$ existuje $c \in (a, b)$, že $f(c) = d$.

Důkaz. Je-li f spojitá funkce, je i $f - d$ je spojitá a pro d ležící mezi $f(a)$ a $f(b)$ platí, že $(f(a) - d)(f(b) - d) \leq 0$. Proto podle Věty 4.10 aplikované na funkci $f - d$ existuje $c \in (a, b)$ tak, že $f(c) - d = 0$. \square

Definice 4.12 (Maximum a minimum funkce)

Řekneme, že funkce f má v bodě $a \in D_f$ **maximum**, resp. **minimum** právě tehdy, když $f(a) \geq f(x)$, resp. $f(a) \leq f(x)$ pro všechny $x \in D_f$.

Definice 4.13 (Omezená funkce)

Řekneme, že funkce f je omezená na množině $M \subset D_f \Leftrightarrow (\exists K > 0)(\forall x \in M)(|f(x)| \leq K)$.

Věta 4.14 (Weierstrass – extrémy spojité funkce na uzavřeném intervalu)

Nechť funkce f je spojitá na intervalu $[a, b]$. Potom funkce f je omezená a nabývá na $[a, b]$ svého minima i maxima, tj. $\exists c \in [a, b]$ a $\exists d \in [a, b]$ tak, že funkce f nabývá v bodě c svého maxima a v bodě d svého minima.

5 Derivace funkce

5.1 Definice

Definice 5.1 (Derivace funkce f v bodě a)

Pokud existuje limita

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h},$$

nazýváme tuto limitu derivací funkce f v bodě a a značíme $f'(a)$, $\frac{df}{dx}(a)$ nebo $f^{(1)}(a)$.

Definice 5.2 (Jednostranné derivace)

Pokud existuje limita

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a + h) - f(a)}{h},$$

resp.

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

nazýváme tuto limitu derivací funkce f v bodě a zleva, resp. zprava a značíme $f'_-(a)$, resp. $f'_+(a)$.

Věta 5.3 (O limitě derivace)

Nechť pro funkci f a bod $a \in D_f$ platí, že

1. $\exists \delta > 0$ tak, že f je diferencovatelná na $(a - \delta, a)$, resp. $(a, a + \delta)$,
2. funkce f je spojitá v bodě a zleva, resp. zprava,
3. $\exists \lim_{x \rightarrow a-} f'(x)$, resp. $\exists \lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$.

Potom existuje $f'_-(a)$, resp. $f'_+(a)$ tak, že platí

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-} f'(x), \quad \text{resp.} \quad f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x).$$

Poznámka. Derivace vyšších řádů $f^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n} f(x)$ n . derivace. Definujeme pomocí indukce $f^{(n)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(n-1)}(x)$, $n \in \mathbb{N}$.

5.2 Pravidla pro derivování

Věta 5.4 (Pravidla pro derivování)

Nechť $\alpha \in \mathbb{R}$, f a g mají v bodě x konečnou derivaci. Potom

1. $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$,
2. $(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x)$
3. $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$,
4. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$, pokud $g(x) \neq 0$

Důkaz. Tvrzení 1. a 2. plynou přímo z definice derivace.

3.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) \overbrace{-f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x)}^0 - f(x)g(x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
& \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x+h) - \left(\frac{f}{g}\right)(x)}{h} = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)} \right) = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{h g(x)g(x+h)} = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - \overbrace{f(x)g(x) + f(x)g(x)}^0 - f(x)g(x+h)}{h g(x)g(x+h)} = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x))g(x) - f(x)(g(x+h) - g(x))}{h g(x)g(x+h)} = \\
&= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}
\end{aligned}$$

□

Věta 5.5 (Derivace funkce x^n)

$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = nx^{n-1}.$$

Důkaz. Důkaz matematickou indukcí pro $n \in \mathbb{N}$. □

Věta 5.6 (Vztah derivace a spojitosti)

Nechť funkce f má v bodě a konečnou derivaci. Pak je v bodě a spojitá.

Důkaz.

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) - f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} (f(a+h) - f(a)) = \lim_{h \rightarrow 0} h \underbrace{\frac{f(a+h) - f(a)}{h}}_{\stackrel{\downarrow}{f'(a) \in \mathbb{R}}} = 0,$$

odkud $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$. □

Věta 5.7 (Leibnizovo pravidlo)

Nechť funkce f a g mají konečnou derivaci n . rádu. Pak

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Poznámka. Nultá derivace funkce $f^{(0)}$ označuje původní funkci f , tj. $f^{(0)} = f$.

Poznámka. Kombinační číslo $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ pro $n \in \mathbb{N}, k \in 0, \dots, n$.

Poznámka. Pro $n = 1$ dává Leibnizovo pravidlo $(f \cdot g)' = f'g + fg'$.

5.3 Derivace složené funkce

Věta 5.8 (Řetězové pravidlo)

Nechť funkce g má konečnou derivaci v a a funkce f má konečnou derivaci v bodě $g(a)$. Potom

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

Důkaz.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

□

Důsledek 5.9 (Řetězové pravidlo pro více funkcí)

$$(f_1 \circ f_2 \circ f_3 \circ \dots \circ f_n)' = f'_1 f'_2 f'_3 \dots f'_n,$$

kde jsou kvůli přehlednosti vynechány body, ve kterých jsou derivace funkcí vyčísleny.

5.4 Derivace inverzní funkce

Věta 5.10 (Derivace inverzní funkce)

Nechť funkce f je prostá a f^{-1} je její inverzní funkce. Nechť funkce f má konečnou derivaci v bodě $x = f^{-1}(y)$. Potom

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Důkaz. Důkaz vychází z Věty 2.11 o inverzní funkci: $f \circ f^{-1} = \text{id}$ a Věty 5.8 o derivaci složené funkce takto:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} (f(f^{-1}(y))) &= \frac{d}{dy} (y), \\ \frac{df}{dx} \left(\underbrace{f^{-1}(y)}_x \right) \cdot \frac{df^{-1}}{dy} (y) &= 1, \end{aligned}$$

odkud vydělením

□

5.5 Tečna a normála

Věta 5.11 (Rovnice tečny)

Nechť existuje konečná derivace funkce f v bodě a . Potom rovnice tečny $t_f(a)$ ke grafu funkce f v bodě a má rovnici

$$t_f(a) : y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Důkaz. Nechť pro malé h je s_h sečna procházející body $[a, f(a)]$ a $[a + h, f(a + h)]$. Tato sečna má rovnici $s_h : y = k(h)x + q(h)$, kde

$$k(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}, \quad q(h) = f(a) - k(h)a.$$

Po limitním přechodu $h \rightarrow 0$ se sečna s_h stane tečnou $t_f(a)$ s rovnicí $t_f(a) : y = kx + q$, kde

$$k = \lim_{h \rightarrow 0} k(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a), \quad q = f(a) - f'(a)a.$$

Odtud plyne tvrzení věty.

□

Věta 5.12 (Rovnice normály)

Nechť existuje konečná nenulová derivace funkce f v bodě a . Potom rovnice normály $n_f(a)$ ke grafu funkce f v bodě a má rovnici

$$n_f(a) : y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a).$$

Důkaz. Normála $n_f(a)$ ke grafu f v bodě a je přímka kolmá na tečnu $t_f(a)$ procházející bodem $[a, f(a)]$. Podle Věty 5.11 má tečna $t_f(a)$ rovnici v normálním tvaru

$$t_f(a) : f'(a)x - y + f(a) - af'(a) = 0,$$

kde koeficienty u x a y tvoří normálový vektor $(f'(a), -1)$. K němu kolmý vektor $(1, f'(a))$ je pak normálovým vektorem normály $n_f(a)$ s rovnicí v normálním tvaru

$$n_f(a) : x + f'(a)y + C = 0.$$

Konstanta C se určí z podmíky protnutí $n_f(a)$ a grafu f v bodě a jako $C = a + f'(a)f(a)$. Odtud již snadno plyne tvrzení věty. \square

5.6 Derivace cyklometrických funkcí

5.6.1 Funkce \arcsin

Funkce \sin je prostá na intervalu $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ a má inverzní funkci, kterou značíme \arcsin .

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $D_{\arcsin} = H_{\sin} = [-1, 1]$ | x [rad] | $\arcsin y$ | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $H_{\arcsin} = D_{\sin} = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ | $\sin x$ | y | $\frac{\sqrt{0}}{2}$ | $\frac{\sqrt{1}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{4}}{2}$ |

Věta 5.13 (Derivace funkce \arcsin)

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{na } (-1, 1)$$

Důkaz. Podle Věty 5.10: $(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y}$, kde $x = \sin y$. Položíme-li $y = \arcsin x$, máme vztah

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}.$$

Už stačí jen upravit pravou stranu. Použijeme vztah mezi sin a cos: $\cos z = \sqrt{1 - \sin^2 z}$, který platí pro $\forall z \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, kde dosadíme $z = \arcsin x$:

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1 - x^2}.$$

\square

5.6.2 Funkce \arccos

Funkce \cos je prostá na intervalu $[0, \pi]$ a má inverzní funkci, kterou značíme \arccos .

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $D_{\arccos} = H_{\cos} = [-1, 1]$ | x [rad] | $\arccos y$ | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $H_{\arccos} = D_{\cos} = [0, \pi]$ | $\cos x$ | y | $\frac{\sqrt{4}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{1}}{2}$ | $\frac{\sqrt{0}}{2}$ |

Lemma 5.14

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

Důkaz. Rovnost

$$\arcsin x = \frac{\pi}{2} - \arccos x$$

je ekvivalentní rovnosti

$$x = \sin(\arcsin x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \arccos x\right).$$

Použijeme-li součtový vzorec pro funkci sin na pravé straně této rovnosti, dostaneme

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \arccos x\right) = \underbrace{\sin \frac{\pi}{2}}_1 \cos(\arccos x) - \underbrace{\cos \frac{\pi}{2}}_0 \sin(\arccos x) = x.$$

□

Věta 5.15 (Derivace funkce \arccos)

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{na } (-1, 1)$$

Důkaz. Plyne z Lemma 5.14. □

5.6.3 Funkce arctg

Funkce tg je prostá na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ a má inverzní funkci, kterou značíme arctg .

$$\begin{aligned} D_{\operatorname{arctg}} &= H_{\operatorname{tg}} = \mathbb{R} \\ H_{\operatorname{arctg}} &= D_{\operatorname{tg}} = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x &= \frac{\pi}{2} \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} x &= -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

| x [rad] | $\operatorname{arctg} y$ | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
|-----------------------|--------------------------|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $\operatorname{tg} x$ | y | 0 | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | nedef. |

Věta 5.16 (Derivace funkce arctg)

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{na } \mathbb{R}$$

Důkaz. Podle Věty 2.11: $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \frac{1}{\operatorname{tg} y}$, kde $x = \operatorname{tg} y$. Položíme-li $y = \operatorname{arctg} x$, máme vztah

$$(\operatorname{arctg} x)' = \operatorname{cos}^2(\operatorname{arctg} x).$$

Už stačí jen upravit pravou stranu. Použijeme následující převod mezi cos a tg:

$$\frac{1}{\operatorname{cos}^2 z} = \frac{\operatorname{cos}^2 z + \operatorname{sin}^2 z}{\operatorname{cos}^2 z} = 1 + \operatorname{tg}^2 z,$$

odkud

$$\operatorname{cos}^2 z = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 z},$$

kde dosadíme $z = \operatorname{arctg} x$. □

5.6.4 Funkce arccotg

Funkce $\cot g$ je prostá na intervalu $(0, \pi)$ a má inverzní funkci, kterou značíme $\operatorname{arccotg}$.

$$\begin{aligned} D_{\operatorname{arccotg}} &= H_{\cot g} = \mathbb{R} \\ H_{\operatorname{arccotg}} &= D_{\cot g} = (0, \pi) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccotg} x &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccotg} x &= \pi \end{aligned}$$

| | | | | | | |
|------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| x [rad] | $\operatorname{arccotg} y$ | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\cot g x$ | y | nedef. | $\sqrt{3}$ | 1 | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 0 |

Lemma 5.17

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x = \frac{\pi}{2}.$$

Důkaz. Rovnost

$$\operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccotg} x$$

je ekvivalentní rovnosti

$$x = \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arccotg} x\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arccotg} x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arccotg} x\right)}.$$

Použijeme-li součtový vzorec pro funkci sin a cos na pravé straně této rovnosti, dostaneme

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arccotg} x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arccotg} x\right)} = \frac{\overbrace{\sin \frac{\pi}{2}}^1 \cos(\operatorname{arccotg} x) - \overbrace{\cos \frac{\pi}{2}}^0 \sin(\operatorname{arccotg} x)}{\underbrace{\cos \frac{\pi}{2}}_0 \cos(\operatorname{arccotg} x) + \underbrace{\sin \frac{\pi}{2}}_1 \sin(\operatorname{arccotg} x)} = \cot g(\operatorname{arccotg} x) = x.$$

□

Věta 5.18 (Derivace funkce arccotg)

$$(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2} \quad \text{na } \mathbb{R}$$

Důkaz. Plyne z Lemma 5.17.

□

6 Užití derivace k vyšetřování funkce

6.1 Věty o přírůstku funkce

Lemma 6.1

Pokud $f'(a) > 0$ (nebo též $f'(a) = +\infty$), pak existuje $\varepsilon > 0$ tak, že pro všechna $h \in (0, \varepsilon)$ platí

$$f(a - h) < f(a) < f(a + h).$$

Pokud $f'(a) < 0$ (nebo též $f'(a) = -\infty$), pak existuje $\varepsilon > 0$ tak, že pro všechna $h \in (0, \varepsilon)$ platí

$$f(a - h) > f(a) > f(a + h).$$

Důkaz. Dokážeme první tvrzení.

Z definice derivace v bodě a víme $f'(a) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{k}(f(a+k) - f(a)) > 0$.

V definici této limity pro námi zvolené $\varepsilon = f'(a) > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že $\forall k \in (-\delta, \delta), k \neq 0$,

$$\left| \frac{f(a+k) - f(a)}{k} - f'(a) \right| < \varepsilon = f'(a),$$

tj.

$$-f'(a) < \frac{f(a+k) - f(a)}{k} - f'(a) < f'(a),$$

tj.

$$0 < \frac{f(a+k) - f(a)}{k} < 2f'(a).$$

Pro $k > 0$ dostáváme $f(a+k) - f(a) > 0$ a volíme $h = k$; celkem: $f(a) < f(a+h)$.

Pro $k < 0$ dostáváme $f(a+k) - f(a) < 0$ a volíme $h = -k$; celkem: $f(a-h) < f(a)$. \square

Věta 6.2 (Rolle)

Nechť funkce f je spojitá na $[a, b]$, má konečnou derivaci na (a, b) a nechť navíc $f(a) = f(b)$. Potom $\exists c \in (a, b)$ tak, že $f'(c) = 0$.

Důkaz. Podle Weierstrassovy Věty 4.14 pro f spojitou na $[a, b]$ existuje f_{\min} a f_{\max} a může nastat právě jeden z následujících dvou případů:

1. f je konstantní $\Rightarrow f' = 0$ pro $\forall x$.

2. f není konstantní a f_{\min} nebo f_{\max} se nabývá uvnitř (a, b) v nějakém bodě c , kde nutně $f'(c) = 0$, jinak bychom byli ve sporu s Lemma 6.1. \square

Věta 6.3 (Lagrange)

Nechť funkce f je spojitá na $[a, b]$ a diferencovatelná na (a, b) . Potom $\exists c \in (a, b)$ tak, že

$$f'(c) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}.$$

Důkaz. Definujme pomocnou funkci $g(x) = f(x) - Kx$, kde K je nějaké číslo zvolené tak, abychom mohli na funkci g použít Rolleho Větu 6.2, tj. chceme splnit předpoklad $g(a) = g(b)$:

$$g(a) = f(a) - Ka \stackrel{?}{=} g(b) = f(b) - Kb,$$

odkud

$$K = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}.$$

Pak podle Rolleho Věty 6.2 existuje $c \in (a, b)$ tak, že $g'(c) = 0$ a tudíž

$$g'(c) = f'(c) - \frac{f(a) - f(b)}{a - b} = 0.$$

\square

Důsledek 6.4

Nechť funkce f je spojitá na $[a, b]$ a nechť $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$. Potom f je konstantní funkce.

Důkaz. Sporem. Předpokládáme, že f je spojitá na $[a, b]$, $\exists f'$ na (a, b) a $\exists c, d \in [a, b]$ tak, že $f(c) \neq f(d)$ (tj. f není konstantní). Pak podle Lagrangeovy Věty 6.3 existuje $e \in (c, d)$ tak, že $f'(e) = \frac{f(d) - f(c)}{d - c}$, což je rovno dle předpokladu 0, tj. $f(d) = f(c)$ a to je spor. \square

Věta 6.5

Nechť funkce f a g jsou spojité na intervalu $[a, b]$ a nechť $f'(x) = g'(x)$ na intervalu (a, b) . Potom $\exists C \in \mathbb{R}$ tak, že $f(x) = g(x) + C \quad \forall x \in [a, b]$.

Důkaz. Definujme pomocnou funkci $h = f - g$, která je spojitá na $[a, b]$ a pro $\forall x \in (a, b)$ $h'(x) = 0$. Podle Důsledku 6.4 je tato funkce konstantní a proto

$$h(x) = f(x) - g(x) = K.$$

□

6.2 Monotonie

Definice 6.6 (Monotonie funkce)

Řekneme, že funkce f na intervalu J

| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| ostře roste | \Leftrightarrow | $(\forall x_1, x_2 \in J)(x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2))$ |
| rosté (neklesá) | \Leftrightarrow | $(\forall x_1, x_2 \in J)(x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2))$ |
| ostře klesá | \Leftrightarrow | $(\forall x_1, x_2 \in J)(x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2))$ |
| klesá (neroste) | \Leftrightarrow | $(\forall x_1, x_2 \in J)(x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2))$ |

Věta 6.7 (Vztah derivace a monotonie)

Nechť funkce f je diferencovatelná na intervalu J . Potom platí

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| $f'(x) > 0 \quad \forall x \in J$ | \Rightarrow | f je ostře rostoucí na J . |
| $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in J$ | \Rightarrow | f je rostoucí (neklesající) na J . |
| $f'(x) < 0 \quad \forall x \in J$ | \Rightarrow | f je ostře klesající na J . |
| $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in J$ | \Rightarrow | f je klesající (nerostoucí) na J . |

6.3 Lokální a globální extrémy

Definice 6.8 (Lokální extrém funkce)

Řekneme, že f má v bodě $a \in D_f$

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| ostré lokální minimum | \Leftrightarrow | $(\exists \varepsilon > 0)(\forall x \in D_f)(0 < x - a < \varepsilon \Rightarrow f(x) > f(a))$ |
| lokální minimum | \Leftrightarrow | $(\exists \varepsilon > 0)(\forall x \in D_f)(0 < x - a < \varepsilon \Rightarrow f(x) \geq f(a))$ |
| ostré lokální maximum | \Leftrightarrow | $(\exists \varepsilon > 0)(\forall x \in D_f)(0 < x - a < \varepsilon \Rightarrow f(x) < f(a))$ |
| lokální maximum | \Leftrightarrow | $(\exists \varepsilon > 0)(\forall x \in D_f)(0 < x - a < \varepsilon \Rightarrow f(x) \leq f(a))$ |

Věta 6.9 (Nutná podmínka existence extrému)

Má-li funkce f v bodě $a \in D_f$ lokální extrém, pak $f'(a) = 0$ nebo $f'(a)$ neexistuje.

Důkaz. Sporem. Předpokládáme-li, že $\exists f'(a)$ a zároveň $f'(a) \neq 0$, pak:

| | | |
|-------------|---------------|---|
| $f'(a) > 0$ | \Rightarrow | f je dle Věty 6.7 v bodě a ostře rostoucí, |
| $f'(a) < 0$ | \Rightarrow | f je dle Věty 6.7 v bodě a ostře klesající, |

což je spor s předpokladem existence lokálního extrému v bodě a . □

Poznámka. **Globální extrémy** spojité a diferencovatelné funkce f na intervalu $[a, b]$ vyšetříme tak, že nalezneme všechny lokální extrémy na (a, b) a porovnáme s hraničními hodnotami $f(a)$ a $f(b)$.

Definice 6.10 (Stacionární bod)

Stacionární bod funkce f je takový bod, ve kterém je derivace funkce rovna 0 nebo neexistuje.

6.4 Test extrému dle 1. derivace

Věta 6.11 (Test extrému funkce dle 1. derivace)

Nechť funkce f je spojitá v bodě $a \in D_f$ a nechť bod a je stacionárním bodem funkce f . Pokud existuje $\delta > 0$ tak, že

- $f' > 0$ na $(a - \delta, a)$ a $f' < 0$ na $(a, a + \delta)$, potom f má v bodě a lokální maximum.
- $f' < 0$ na $(a - \delta, a)$ a $f' > 0$ na $(a, a + \delta)$, potom f má v bodě a lokální minimum.
- f' má stejné znamení v $(a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$, potom f nemá v bodě a lokální extrém.

6.5 Test extrému dle 2. derivace

Věta 6.12 (Test extrému funkce dle 2. derivace)

Nechť funkce f je spojitá v bodě $a \in D_f$ a nechť $f'(a) = 0$.

1. Pokud $f''(a) < 0$, potom f má v bodě a ostré lokální maximum,
2. Pokud $f''(a) > 0$, potom f má v bodě a ostré lokální minimum.

Důkaz. Dokážeme první tvrzení. Pokud $f''(a) < 0$, pak f' je ostře klesající v bodě a . Pak $\exists \delta > 0$ tak, že pro každé x_1, x_2 : $a - \delta < x_1 < a < x_2 < a + \delta$ platí

$$f'(x_1) > \underbrace{f'(a)}_0 > f'(x_2)$$

a tudíž podle Věty 6.11 je v bodě a ostré lokální maximum. \square

Příklad. Trhovec potřebuje z kruhového papíru o poloměru R udělat kornout o maximálním objemu. Jakou kruhovou výseč je potřeba vystřihnout?

Řešení: $\alpha \dots$ úhel v radiánech, $r \dots$ poloměr podstavy kuželu

Obvod podstavy kužele je $2\pi r = 2\pi R - R\alpha$, odkud $r = R \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi}\right)$.

Výška kužele:

$$v = \sqrt{R^2 - r^2} = R \sqrt{1 - \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi}\right)^2} = R \sqrt{\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\alpha^2}{4\pi^2}}.$$

Hledáme maximum objemu kužele $V(\alpha) = \frac{\pi}{3} R^3 \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi}\right)^2 \sqrt{\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\alpha^2}{4\pi^2}}$ pro $\alpha \in (0, 2\pi)$:

$$V'(\alpha) = \frac{R^3}{3} \left(\frac{\alpha}{\pi} - \frac{\alpha^2}{4\pi^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi}\right) \left(1 - 3\frac{\alpha}{\pi} + 3\frac{\alpha^2}{4\pi^2}\right) \stackrel{!}{=} 0.$$

Řešením této rovnice jsou pro $\alpha \in (-2\pi, 2\pi)$ kořeny $\alpha_{1,2} = 2\pi \left(1 \pm \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. Nyní stačí aplikovat buď Větu 6.11 nebo Větu 6.12 a ukázat, že pro tato $\alpha_{1,2}$ nabývá funkce $V(\alpha)$ maximum.

6.6 Konvexní a konkávní funkce

Definice 6.13 (Konvexní a konkávní funkce)

Nechť je funkce f diferencovatelná na (a, b) . Říkáme, že funkce f je

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| ryze konvexní | \Leftrightarrow | f' je ostře rostoucí na (a, b) |
| konvexní | \Leftrightarrow | f' je rostoucí na (a, b) |
| ryze konkávní | \Leftrightarrow | f' je ostře klesající na (a, b) |
| konkávní | \Leftrightarrow | f' je klesající na (a, b) |

Poznámka. Konvexní a konkávní funkce jsme zde definovali pomocí pojmu derivace, tedy pouze pro diferencovatelné funkce. Pojem konvexnosti a konkávnosti funkce lze zavést i pro obecné funkce, viz např. Odstavec 4.7 v [1].

Definice 6.14 (Inflexní bod)

Nechť funkce f je diferencovatelná v bodě a . Řekneme, že bod a je **inflexním bodem** funkce f právě tehdy, když se v bodě a mění charakter funkce f z konvexní na konkávní nebo opačně.

Věta 6.15 (Nutná podmínka existence inflexního bodu)

Bud' c inflexní bod. Potom $f''(c) = 0$ nebo $f''(c)$ neexistuje.

6.7 l'Hôpitalovo pravidlo

Věta 6.16 (l'Hôpitalovo pravidlo)

Bud' $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$. Nechť f má konečnou derivaci a $g'(x) \neq 0$ na $(a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$ pro nějaké $\delta > 0$. Dále nechť platí jedna ze dvou podmínek:

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \wedge \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

2. $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty$

Potom jestliže existuje limita na levé straně následující rovnice, platí mezi limitami rovnost

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

6.8 Vyšetřování průběhu funkce

Poznámka. Při vyšetřování průběhu funkce f (tj. chceme alespoň zjistit přibližný graf funkce) postupně zkoumáme:

1. definiční obor D_f ,
2. limity v krajních bodech D_f ,
3. asymptoty v $\pm\infty$, případně vertikální asymptoty
4. první derivaci funkce f' její definiční obor ($D_{f'} \subseteq D_f$),
5. intervaly monotonie,
6. druhou derivaci funkce f'' a její definiční obor $D_{f''}$,
7. lokální extrémy funkce f ,
8. globální extrémy funkce f na D_f ,
9. konvexnost/konkávnost funkce,
10. inflexní body,
11. významné body pro kreslení (extrémy, průsečíky s osami a pod.).

7 Integrální počet

7.1 Primitivní funkce a neurčitý integrál

Definice 7.1 (Primitivní funkce)

Funkci F nazveme primitivní k funkci f na intervalu $[a, b]$, pokud F je spojitá na intervalu $[a, b]$ a platí $F'(x) = f(x)$ pro všechna $x \in (a, b)$.

Věta 7.2 (O jednoznačnosti primitivní funkce)

Buď funkce F primitivní k funkci f na intervalu (a, b) . Potom funkce G je primitivní k funkci f právě když $(\exists C \in \mathbb{R})(\forall x \in (a, b)) (F(x) = G(x) + C)$.

Důkaz. Zjevně $F' = G'$, proto z definice 7.1 plyne, že funkce G je primitivní k f . □

Definice 7.3 (Neurčitý integrál)

Nechť pro funkci f existuje primitivní funkce F na (a, b) . Množinu všech primitivních funkcí k funkci f nazveme neurčitým integrálem funkce f v intervalu (a, b) a značíme symbolem

$$\int f(x) dx, \quad \text{nebo krátce} \quad \int f.$$

Poznámka.

$$\int f = \int f(x) dx = \{F : F \text{ je primitivní k } f\} = F(x) + C,$$

kde f ... integrand, x ... integrační proměnná, F ... reprezentant (=nějaká primitivní funkce), C ... integrační konstanta.

Věta 7.4 (Linearita integrace)

Buď F , resp. G primitivní funkce k f , resp. g na (a, b) a $\alpha \in \mathbb{R}$. Pak $F + \alpha G$ je primitivní funkce k $f + \alpha g$ na (a, b) .

Důkaz. Plyne z linearity derivace a definice 7.1. □

Věta 7.5 (Per partes)

Nechť f, g mají na (a, b) konečné derivace a funkce $h = fg'$ má v (a, b) primitivní funkci H . Potom funkce $f'g$ má v (a, b) primitivní funkci $fg - H$.

Neboli

$$\int fg' = fg - \int f'g.$$

Důkaz. Stačí ověřit, zda funkce $fg - H$ je primitivní k $f'g$, tj. dle definice 7.1 a pravidla pro derivaci součinu (Věta 5.4)

$$(fg - H)' = f'g + \underbrace{fg'}_h - \underbrace{H'}_h = f'g + h - h = f'g.$$

□

Věta 7.6 (Substituce)

Nechť f má v (a, b) primitivní funkci F , φ je prostá a má v (α, β) konečnou derivaci φ' a $\varphi(\alpha, \beta) \subset (a, b)$. Potom funkce $F \circ \varphi$ je primitivní funkce $(f \circ \varphi)\varphi'$ v intervalu (α, β) . Neboli

$$\int f(z) dz = \int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C.$$

Důkaz. Stačí ověřit, zda funkce $F \circ \varphi$ je primitivní k $(f \circ \varphi)\varphi'$, tj. dle definice 7.1 a Věty 5.8 (řetězové pravidlo)

$$\left((F \circ \varphi)(x) \right)' = F'(\varphi(x))\varphi'(x).$$

□

Lemma 7.7

Pro $n \neq -1$ platí $\int x^n = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$.

7.2 Určitý integrál

Definice 7.8 (Rozdelení intervalu σ)

Rozdelením σ intervalu $[a, b]$ rozumíme množinu bodů $\sigma = \{x_k : k = 0, 1, 2, \dots, n\}$ takovou, že $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. Intervaly $[x_{k-1}, x_k]$ nazýváme částečnými intervaly rozdelení σ pro $k = 1, 2, \dots, n$.

Definice 7.9 (Horní integrální součet $S_f(\sigma)$)

Horní integrální součet $S_f(\sigma)$ funkce f při rozdelení σ je

$$S_f(\sigma) = \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}),$$


kde $M_k = \max \{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$ pro $k = 1, 2, \dots, n$.

Definice 7.10 (Dolní integrální součet $s_f(\sigma)$)

Dolní integrální součet $s_f(\sigma)$ funkce f při rozdelení σ je

$$s_f(\sigma) = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1}),$$

kde $m_k = \min \{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$ pro $k = 1, 2, \dots, n$.



Obrázek 2: Ilustrace k Riemannově definici určitého integrálu

Definice 7.11 (Určitý integrál)

Bud' $s_f(\sigma)$, resp. $S_f(\sigma)$ dolní, resp. horní integrální součet funkce f při rozdelení σ intervalu $[a, b]$. Potom jednoznačně určené číslo I , které pro všechna možná rozdelení σ splňuje

$$s_f(\sigma) \leq I \leq S_f(\sigma)$$

se nazývá určitý integrál funkce f od a do b (přes interval (a, b)) a značí se

$$I = \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f.$$

Funkce, která má určitý integrál se nazývá Riemannovsky integrovatelná (integrabilní).

Věta 7.12 (Základní vlastnosti určitého integrálu)

1. $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$, pokud jednotlivé integrály existují.
2. $\int_a^a f = 0$
3. $\int_a^b f = - \int_b^a f$

Důkaz.

1. Plyne přímo z definice 7.11 nebo též z grafického znázornění integrálu jako plochy pod grafem funkce f pokud $a < b < c$.
2. Z prvního tvrzení je patrné, že pro volbu $a = b = c$ máme rovnost $2 \int_a^a f = \int_a^a f$, kterou splňuje pouze $\int_a^a f = 0$.
3. Z prvního a druhého tvrzení dostaneme pro volbu $c = a$ rovnost $\int_a^b f + \int_b^a f = 0$, odkud již plyne třetí tvrzení.

□

Definice 7.13 (Integrál jako funkce horní, resp. dolní meze)

Nechť funkce f je Riemannovsky integrovatelná na intervalu $[a, b]$. Potom

$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

nazýváme **integrálem jako funkcí horní meze** a

$$x \mapsto \int_x^b f(t) dt$$

nazýváme **integrálem jako funkcí dolní meze**.

Lemma 7.14

Funkce $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ je primitivní funkce k funkci f , tj.

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t)dt \right) = f(x).$$

Věta 7.15 (Newtonova formule)

Nechť funkce f je spojitá na $[a, b]$ a F její primitivní funkce. Potom

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Důkaz. Dle lemmatu 7.14 zkoumejme primitivní funkci F k f ve tvaru

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + K,$$

kde $K \in \mathbb{R}$. Z hodnoty v bodě $x = a$ určíme K takto:

$$F(a) = \int_a^a f(t)dt + K = 0 + K,$$

odkud $K = F(a)$. Z hodnoty v bodě $x = b$ pak dostaneme tvrzení věty:

$$F(b) = \int_a^b f(t)dt + F(a).$$

□

Věta 7.16 (Per partes)

Nechť funkce f, g mají na $[a, b]$ spojité derivace. Potom

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

Důkaz. Plyne z vět 7.5 a 7.15. □

Věta 7.17 (Substituce)

Budť φ' spojitá a nenulová na intervalu $[\alpha, \beta]$ (tj. φ je prostá na $\alpha, \beta]$). Nechť funkce f je spojitá na H_φ . Potom

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u) du.$$

Důkaz. Plyne z vět 7.6 a 7.15. □

7.3 Vlastnosti určitého integrálu

Věta 7.18 (Vlastnosti určitého integrálu)

Nechť $a \leq b$.

1. Nechť $f \geq 0$ na (a, b) . Pak $\int_a^b f \geq 0$.

2. Nechť $f > 0$ na (a, b) . Pak $\int_a^b f > 0$.

3. Nechť $f < g$ na (a, b) . Pak $\int_a^b f < \int_a^b g$.

4. $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$, přičemž rovnost nastává, pokud je funkce f nezáporná na (a, b) .

5. $m(b-a) < \int_a^b f < M(b-a)$, kde $m = \min \{f(x) : x \in [a, b]\}$ a $M = \max \{f(x) : x \in [a, b]\}$.

Věta 7.19 (Věta o střední hodnotě integrálu)

Nechť f a g jsou spojité funkce na intervalu $[a, b]$ a navíc funkce g nezáporná na $[a, b]$. Potom $\exists c \in [a, b]$ tak, že

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx.$$

Důkaz. Označme $m = \min \{f(x) : x \in [a, b]\}$ a $M = \max \{f(x) : x \in [a, b]\}$, pak platí

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

Integrací přes interval $[a, b]$ dostaneme nerovnost

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

Celou nerovnost můžeme vydělit kladným integrálem (číslem) $\int_a^b g$, neboť dle předpokladů je $g > 0$

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\underbrace{\int_a^b g(x) dx}_Y} \leq M.$$

Tento výsledek je možné interpretovat také tak, že pro Y ležící mezi m (minimem f) a M (maximem f) existuje ze spojitosti funkce f takové $c \in [a, b]$, že $f(c) = Y$. \square

Důsledek 7.20

Nechť f je spojitá na $[a, b]$. Pak existuje $c \in [a, b]$ tak, že

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a).$$

Důkaz. Ve větě 7.19 zvolme $g(x) = 1$. □

8 Transcendentní funkce

8.1 Algebraické a transcendentní funkce

Definice 8.1 (Algebraické číslo)

Algebraické číslo je číslo, které je kořenem polynomu s racionálními koeficienty.

Definice 8.2 (Transcendentní číslo)

Transcendentní číslo je číslo, které není algebraické.

Definice 8.3 (Algebraická funkce)

Algebraická funkce splňuje polynomiální rovnici s polynomiálními koeficienty.

Definice 8.4 (Transcendentní funkce)

Transcendentní funkce je funkce, která není algebraická.

8.2 Logaritmická funkce

Definice 8.5 (Logaritmická funkce)

Logaritmická funkce je nekonstantní diferencovatelná funkce f definovaná na \mathbb{R}^+ , která pro všechny $x > 0$ a $y > 0$ splňuje

$$f(xy) = f(x) + f(y).$$

Věta 8.6 (Vlastnosti logaritmické funkce)

Budě f logaritmická funkce. Potom

1. $f(1) = 0$
2. $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$
3. $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$
4. $f'(x) = \frac{1}{x}f'(1)$, kde $f'(1)$ odpovídá bázi logaritmu.

Důkaz.

1. $f(1) = f(1 \cdot 1) = f(1) + f(1) = 2f(1)$ odkud $f(1) = 0$.
2. $0 = f(1) = f(x \cdot \frac{1}{x}) = f(x) + f(\frac{1}{x})$ odkud $f(x) = -f(\frac{1}{x})$.
3. viz 2.

$$4. f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x}{x} \frac{1}{h} f\left(\frac{x+h}{x}\right) \stackrel{u=\frac{h}{x}}{=} \frac{1}{x} \lim_{u \rightarrow 0} \underbrace{\frac{1}{u} (f(1+u) - f(1))}_0 = \frac{1}{x} f'(1)$$

□

8.3 Přirozený logaritmus

Definice 8.7 (Přirozený logaritmus)

Funkce

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}, \quad (4)$$

pro $x > 0$ se nazývá **přirozený logaritmus**.

Věta 8.8

Funkce \ln je logaritmická funkce.

Důkaz. Předpokládejme bez újmy na obecnosti, že $0 < x < y$.

Podle definice 8.5 musíme ukázat, že $\ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y$:

$$\ln(xy) = \int_1^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^x \frac{dt}{t} + \int_x^{xy} \frac{dt}{t} \stackrel{u=\frac{t}{x}}{=} \int_1^x \frac{dt}{t} + \int_1^y \frac{du}{u} = \ln x + \ln y.$$

□

Věta 8.9 (Vlastnosti $\ln x$)

Funkce $\ln x$ definovaná vztahem (4) má následující vlastnosti:

1. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
2. \ln je ostře rostoucí na D_{\ln} .
3. $\ln x^\alpha = \alpha \ln x$ pro $\alpha \in \mathbb{R}$.

Důkaz.

1. Derivací integrálu jakožto funkce horní meze v definici 8.7 dostáváme tvrzení věty, což zároveň odpovídá „přirozené“ volbě $f'(1) = 1$ ve větě 8.6(4.).
2. Pro všechna $x \in D_{\ln} = \mathbb{R}^+$ je $\frac{1}{x} > 0$ a tudíž podle věty 6.7 ostře roste.
3. Pro $\alpha = 0$ tvrzení zjevně platí. Pro $\alpha \neq 0$ máme

$$\ln x^\alpha = \int_1^{x^\alpha} \frac{dt}{t} \stackrel{t=u^\alpha}{=} \alpha \int_1^x \frac{u^{\alpha-1}}{u^\alpha} du = \alpha \ln x.$$

□

Definice 8.10 (Eulerovo číslo)

Eulerovo číslo e je jediné číslo, které splňuje $\ln e = 1$.

8.4 Exponenciální funkce

Definice 8.11 (Exponenciální funkce)

Inverzní funkci k funkci \ln nazýváme exponenciální funkci při základu e a značíme e^x nebo $\exp(x)$.

Věta 8.12 (Vlastnosti exponenciální funkce)

1. $(e^x)' = e^x$ pro $x \in \mathbb{R}$.
2. $e^{x+y} = e^x e^y$ pro $x, y \in \mathbb{R}$.
3. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ pro $x \in \mathbb{R}$.

Důkaz.

1. Podle věty 5.10 o derivaci inverzní funkce platí

$$(e^x)' = \frac{1}{\left(\frac{1}{e^x}\right)} = e^x.$$

2. $\ln e^{x+y} = (x+y) \ln e = x+y = x \ln e + y \ln e = \ln e^x e^y$.
3. viz 2.

□

8.5 Obecná mocnina

Definice 8.13 (Obecná mocnina)

Pro $\beta > 0$ a $\alpha \in \mathbb{R}$ definujeme **obecnou mocninu** jako

$$\beta^\alpha = e^{\alpha \ln \beta},$$

kde β je báze (základ) a α exponent (mocnina).

Věta 8.14 (Vlastnosti obecné mocniny)

Nechť $x > 0$ a $a, b \in \mathbb{R}$. Pak

1. $x^{a+b} = x^a x^b$.
2. $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$.
3. $(x^a)' = ax^{a-1}$.
4. $(a^x)' = (\ln a) \cdot a^x$.

Důkaz. Všechny body věty plynou z definice 8.13 a vlastností logaritmu.

□

8.6 Obecná báze logaritmu

Definice 8.15 (Obecná báze logaritmu)

Pro $p > 0$, $p \neq 1$ definujeme **logaritmus při základu p** jako

$$\log_p x = \frac{\ln x}{\ln p},$$

kde p je báze (základ). Pro $p = 10$ definujeme dekadický logaritmus a značíme zkráceně symbolem \log .

Věta 8.16 (Vlastnosti logaritmu)

1. $\log_p x$ je inverzní funkce k p^x .
2. $(\log_p x)' = \frac{1}{\ln p} \frac{1}{x}$.

3. $\log_p x$ je logaritmická funkce.

Důkaz.

1. Podle definice 8.15 je funkce \log_p stejně jako \ln prostá na \mathbb{R}^+ . Stačí ověřit obě vlastnosti inverzní funkce $f \circ f^{-1} = \text{id}$ a $f^{-1} \circ f = \text{id}$ (viz věta 2.13):

$$\log_p p^x = \frac{\ln p^x}{\ln p} = \frac{x \ln p}{\ln p} = x,$$

$$p^{\log_p x} = e^{\log_p(x) \cdot \ln p} = e^{\frac{\ln x}{\ln p} \ln p} = e^{\ln x} = x$$

2. Tvrzení plyne přímou derivací definice 8.15 podle x .

3. Ověření vlastnosti logaritmické funkce (viz definice 8.5):

$$\log_p(x \cdot y) = \frac{\ln(x \cdot y)}{\ln p} = \frac{\ln x + \ln y}{\ln p} = \frac{\ln x}{\ln p} + \frac{\ln y}{\ln p} = \log_p x + \log_p y$$

□

8.7 Hyperbolické funkce

Definice 8.17 (Hyperbolické funkce)

$$\begin{aligned}\sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \\ \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \\ \tgh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \\ \cotgh x &= \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}\end{aligned}$$

Věta 8.18 (Vlastnosti hyperbolických funkcí \sinh a \cosh)

1. $\cosh x > \frac{1}{2}e^x > \sinh x$
2. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.
3. $\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x$
4. $\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$

Důkaz. Tvrzení se dokáží dosazením vzorců z definice 8.17. □


Věta 8.19 (Derivace hyperbolických funkcí)

$$(\sinh x)' = \cosh x, \tag{5}$$

$$(\cosh x)' = \sinh x, \tag{6}$$

$$(\tgh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}, \tag{7}$$

$$(\cotgh x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x} \tag{8}$$



Obrázek 3: Grafy hyperbolických funkcí.

8.8 Inverzní hyperbolické funkce

Definice 8.20 (Inverzní hyperbolické funkce)

$$\operatorname{argsinh} x = \sinh^{-1} x$$

argument hyperbolického sinu,

$$\operatorname{argcosh} x = \cosh^{-1} x$$

argument hyperbolického cosinu,

$$\operatorname{argtgh} x = \operatorname{tgh}^{-1} x,$$

argument hyperbolické tangenty,

$$\operatorname{argcotgh} x = \operatorname{cotgh}^{-1} x,$$

argument hyperbolické kotangenty.

Věta 8.21 (Explicitní vyjádření inverzních hyperbolických funkcí)

$$\operatorname{argsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad \text{pro } x \in \mathbb{R} \quad (9)$$

$$\operatorname{argcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad \text{pro } x \geq 1 \quad (10)$$

$$\operatorname{argtgh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad \text{pro } x \in (-1, 1) \quad (11)$$

$$\operatorname{argcotgh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1} \quad \text{pro } x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty). \quad (12)$$

Důkaz. Pro jednotlivé funkce je potřeba odvodit inverzní funkci pomocí techniky explicitního vyjádření $x = f^{-1}(y)$ ze vztahu $y = f(x)$.

1. $y = \sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, kde vynásobením rovnice e^x dostáváme kvadratickou rovnici pro neznámou „ e^x “:

$$(e^x)^2 - 2ye^x - 1 = 0,$$

kterou řeší

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}.$$

Z těchto řešení vyhovuje pouze $e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$, protože $H_{e^x} = \mathbb{R}^+$. Odtud již plyne tvrzení věty.

2. Funkce \cosh není na \mathbb{R} prostá a proto nejprve zúžíme definiční obor např. na \mathbb{R}_0^+ tak, abychom dostali prostou funkci. $y = \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, kde vynásobením rovnice e^x dostáváme kvadratickou rovnici pro neznámou „ e^x “:

$$(e^x)^2 + 2ye^x - 1 = 0,$$

kterou řeší

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 - 1}.$$

Z těchto řešení vyhovuje pouze $e^x = y + \sqrt{y^2 - 1}$, protože pro daný definiční obor funkce $\cosh (x \geq 0)$ je funkce $e^x \geq 1$. Odtud již plyne tvrzení věty.

3. $y = \operatorname{tgh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, kde vynásobením rovnice $e^x(e^x + e^{-x})$ dostáváme kvadratickou rovnici pro neznámou „ e^x “:

$$(y - 1)(e^x)^2 + y + 1 = 0,$$

kterou řeší

$$e^x = \pm \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}.$$

Z těchto řešení vyhovuje pouze to kladné, neb $H_{e^x} = \mathbb{R}^+$. Odtud již plyne tvrzení věty.

4. Inverzní funkce k cotgh – viz 3.

□

Věta 8.22 (Derivace inverzních hyperbolických funkcí)

$$(\operatorname{argsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad (13)$$

$$(\operatorname{argcosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \quad (14)$$

$$(\operatorname{argtgh} x)' = (\operatorname{argcotgh} x)' = \frac{1}{1-x^2} \quad (\text{pozor na různé definiční obory!}). \quad (15)$$

Důkaz. Větu snadno dokážeme derivací explicitního vyjádření inverzních funkcí ve větě 8.21.

□

8.9 Pokročilé techniky integrace goniometrických funkcí

Poznámka. Dle lemma 3.14 lze snížit druhou mocninu funkcí \sin a \cos :

$$\begin{aligned} \cos^2(x) &= \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \\ \sin^2(x) &= \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \end{aligned}$$

čehož je možné využít při integraci výrazů tvaru $\int \sin^m x \cos^n x dx$, kde $m, n \in \mathbb{N}_0$:

1. Jsou-li m i n sudé:

Použijeme lemma 3.14 na $\int (\sin^2 x)^{\frac{m}{2}} (\cos^2 x)^{\frac{n}{2}} dx$

2. Jsou-li (m sudé a n liché) nebo (m liché a n sudé):

Substituujeme funkci se sudou mocninou (z funkce s lichou mocninou dostaneme diferenciál), např. pro m -sudé, n -liché:

$$\int \sin^m x (\cos^2 x)^{\frac{n-1}{2}} \cos x dx = \left| u = \sin x \right| = \int u^m (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du$$

3. Jsou-li m i n liché:

Převedeme integrand pomocí součtových vzorců $2 \sin x \cos x = \sin(2x)$ a lemma 3.14 na výraz předchozích typů, např. pro $m < n$:

$$\int \sin^m x \cos^n x dx = \int (\sin x \cos x)^m (\cos^2 x)^{\frac{n-m}{2}} dx = \int \left(\frac{\sin(2x)}{2} \right)^m \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^{\frac{n-m}{2}} dx,$$

kde poznamenejme, že $m - n$ je sudé číslo.

Lemma 8.23 (Vzorce pro součin goniometrických funkcí)

$$\begin{aligned} \cos(mx) \cos(nx) &= \frac{1}{2} \left(\cos[(n+m)x] + \cos[(n-m)x] \right) \\ \sin(mx) \sin(nx) &= \frac{1}{2} \left(\cos[(n-m)x] - \cos[(n+m)x] \right) \\ \sin(mx) \cos(nx) &= \frac{1}{2} \left(\sin[(m-n)x] + \sin[(n+m)x] \right) \end{aligned}$$

Důkaz. Větu dokážeme pomocí součtových vzorců pro funkce cos a sin. \square

Poznámka. Pomocí lemma 8.23 se integrály typu $\int \cos(\alpha x) \sin(\beta x) dx$, $\int \cos(\alpha x) \cos(\beta x) dx$ a $\int \sin(\alpha x) \sin(\beta x) dx$, pro $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ převedou na známé integrály.

8.10 Shrnutí integračních vzorců

Poznámka.

| Typ integrálu | Výsledný typ funkce | Substituce |
|--|------------------------------|--|
| $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - (x+b)^2}}$ | arcsin nebo $-\arccos$ | $x+b = a \sin u$ nebo $x+b = a \cos u$ |
| $\int \frac{dx}{a^2 + (x+b)^2}$ | arctg nebo $-\text{arccotg}$ | $x+b = atg u$ nebo $x+b = acotg u$ |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{(x+b)^2 + a^2}}$ | argsinh | $x+b = a \sinh u$ |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{(x+b)^2 - a^2}}$ | argcosh | $x+b = a \cosh u$ |
| $\int \frac{dx}{(x+b)^2 - a^2}$ | argtgh nebo argcotgh | $x+b = atgh u$ nebo $x+b = acotgh u$ |

9 Aplikace integrálu

9.1 Výpočet plochy

Věta 9.1 (Výpočet plochy mezi funkcemi)

Nechť jsou f a g funkce spojité na intervalu $[a, b]$. Potom plocha A vymezená těmito funkcemi

je

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx.$$

Důsledek 9.2 (Plocha pod grafem funkce)

Nechť je funkce f spojitá a nezáporná na intervalu $[a, b]$. Pak plocha A_f vymezená grafem funkce f a osou x je

$$A_f = \int_a^b f(x) \, dx.$$

9.2 Výpočet polohy těžiště

Věta 9.3 (Poloha těžiště plochy pod grafem funkce)

Nechť funkce f je spojitá na $[a, b]$. Potom pro těžiště $T = [\bar{x}, \bar{y}]$ plochy pod grafem funkce f platí

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) \, dx}{\int_a^b f(x) \, dx}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) \, dx}{\int_a^b f(x) \, dx}.$$

Důkaz. Pro důkaz věty použijeme analogii postupu hledání těžiště n hmotných bodů z fyziky. Poloha těžiště z_T pro n hmotných bodů o hmotnostech m_k a polohách z_k (na ose z) je

$$z_T = \frac{\sum_{k=1}^n m_k z_k}{\sum_{k=1}^n m_k}.$$

Na chvíli předpokládejme, že uvažovaná plocha pod grafem funkce f má všude stejnou hustotu ϱ . Uvažujme rozdělení $\sigma = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b\}$ intervalu $[a, b]$.

Označme A_k jednotlivé dílčí plochy pod grafem funkce f mezi x_{k-1} a x_k . Dále označme polohu těžiště na ose x symbolem t_k . Snadno nahlédneme, že polohu těžiště A_k na ose y lze vyjádřit $y_k = \frac{1}{2} f(t_k)$. Hmotnost dílčí plochy A_k lze vyjádřit jako $m_k = \varrho f(t_k)(x_k - x_{k-1})$. Každou dílčí plochu A_k lze reprezentovat hmotným bodem o souřadnicích $[t_k, \frac{1}{2} f(t_k)]$ a hmotnosti m_k .

Podle vzorce pro polohu těžiště n hmotných bodů dostaváme pro jednotlivé souřadnice polohy těžiště $x_T(\sigma)$ a $y_T(\sigma)$ (při rozdělení σ) vyjádření

$$x_T(\sigma) = \frac{\sum_{k=1}^n \varrho t_k f(t_k)(x_k - x_{k-1})}{\sum_{k=1}^n \varrho f(t_k)(x_k - x_{k-1})}, \quad (16)$$

$$y_T(\sigma) = \frac{\sum_{k=1}^n \varrho \frac{1}{2} f^2(t_k)(x_k - x_{k-1})}{\sum_{k=1}^n \varrho f(t_k)(x_k - x_{k-1})}, \quad (17)$$

kde $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$. Hustota ϱ je konstantní, proto ji můžeme vykrátit z obou výrazů. Pro dokončení důkazu stačí v jednotlivých sumách odhadnout funkci $t \cdot f(t)$, resp. $f(t)$, resp. $\frac{1}{2} f^2(t)$ svými maximy a minimy na dílčích intervalech $[x_{k-1}, x_k]$, čímž obdržíme horní a dolní částečné součty. Protože jsme v celém odvození uvažovali libovolné rozdělení σ , dostaváme podle Riemannovy definice určitého integrálu 7.11 tvrzení věty. \square

9.3 Délka grafu funkce

Věta 9.4 (Délka grafu funkce)

Nechť funkce f má spojitou první derivaci na intervalu $[a, b]$. Potom délka grafu funkce L_f je

$$L_f = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx.$$

Důkaz. Nechť σ je rozdělení intervalu $[a, b]$. S využitím Pythagorovy věty můžeme délku grafu funkce approximovat úsečkou délky d_k na každém dílčím intervalu $[x_{k-1}, x_k]$ takto:

$$d_k = \sqrt{(f(x_k) - f(x_{k-1}))^2 + (x_k - x_{k-1})^2} = (x_k - x_{k-1}) \sqrt{1 + \left(\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \right)^2}.$$

Na intervalu $[x_{k-1}, x_k]$ použijeme Lagrangeovu větu 6.3 o přírůstku funkce: $\exists c_k \in (x_{k-1}, x_k)$ tak, že

$$d_k = (x_k - x_{k-1}) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2}.$$

Označíme-li

$$\begin{aligned} m_k &= \min \left\{ \sqrt{1 + (f'(z))^2} : z \in [x_{k-1}, x_k] \right\}, \\ M_k &= \max \left\{ \sqrt{1 + (f'(z))^2} : z \in [x_{k-1}, x_k] \right\}, \end{aligned}$$

dostáváme nerovnost

$$(x_k - x_{k-1})m_k \leq d_k \leq (x_k - x_{k-1})M_k$$

pro všechna k . Sečteme-li tuto nerovnost přes všechna $k = 1, 2, \dots, n$, máme

$$S_{\sqrt{1+(f')^2}}(\sigma) \leq L_f(\sigma) \leq S_{\sqrt{1+(f')^2}}(\sigma).$$

Odtud již plyne tvrzení věty. □

9.4 Objem a povrch rotačního tělesa

Věta 9.5 (Objem rotačního tělesa)

Nechť funkce f je nezáporná a má spojitou první derivaci na intervalu $[a, b]$. Potom objem rotačního tělesa, které vznikne rotací grafu f okolo osy x je

$$V_f = \pi \int_a^b f^2(x) \, dx.$$

Věta 9.6 (Povrch rotačního tělesa)

Nechť funkce f je nezáporná a má spojitou první derivaci na intervalu $[a, b]$. Potom povrch rotačního tělesa, které vznikne rotací grafu f okolo osy x je

$$S_f = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx.$$

Reference

- [1] E. Dontová, *Matematika I*, Vydavatelství ČVUT, 1999
- [2] E. Dontová, *Matematika II*, Vydavatelství ČVUT, 1996
- [3] V. Jarník, *Diferenciální počet I*, ČSAV, 1955
- [4] S. L. Salas, E. Hille, *Calculus, One Variable* John Wiley and Sons, 1990 (6th edition), ISBN 0-471-51749-6